

GRIGLIA PER LA SELEZIONE DEI DONATORI

ESCLUSIONE PERMANENTE A TUTELA DEL DONATORE	
Malattie autoimmuni	Esclusa la malattia celiaca (se il donatore segue una dieta priva di glutine)
Malattie cardiovascolari	Donatori con affezioni cardiovascolari in atto o pregresse (tranne anomalie congenite curate)
Malattie organiche del Snc	Antecedenti di gravi malattie organiche del Snc
Neoplasie o mal. Maligne	Eccezione cancro in situ con guarigione completa
Tendenza anomala all'emorragia	Candidati donatori con antecedenti di coagulopatia congenita o acquisita importante
Crisi di svenimenti e/o convulsioni	Convulsioni diverse da quelle febbrili infantili a eccezione di quelle per le quali sono trascorsi tre anni dall'ultima terapia senza ricadure
Mal. gastrointestinali, epatiche, urogen., ematol., immunol., renali, metab. o respiratorie	Candidati donatori con grave affezione attiva, cronica o recidivante

ESCLUSIONE PERMANENTE A TUTELA DEL RICEVENTE	
Malattie infettive	Epatite C, B (eccetto persone divenute HbsAg negative e HbsAb positive); Haiv 1-2; Htlv I/II; babesiosi; lebbra; Kala Azar (leishmaniosi v.) m. di Chagas; sifilide; epatite indeterminata
Encefalopatia spongiforme trasmissibile (Tse) (es. morbo di Creutzfeldt-Jacob, nuova variante di Creutzfeldt-Jacob)	<ul style="list-style-type: none"> * Persone con precedenti a rischio di Tse, compresi trapianti di cornea e/o della dura madre e/o curati con estratti di ghiandola pituitaria u. * Candidati donatori che dall'80 al '96 hanno soggiornato per più di sei mesi cumulativi in UK * Riceventi trasfusi in UK dopo l'80
Assunzione di sostanze farmacologiche (Im, Ev, altro) con modalità tali da trasmettere malattie infettive	Sostanze stupefacenti, steroidi per culturismo ecc.
Riceventi Xenotrapiantati	
Comportamento sessuale	Persone ad alto rischio di contrarre malattie sessualmente trasmissibili
Alcolismo cronico	

ESCLUSIONE TEMPORANEA	
Glomerulonefrite acuta	5 anni dalla completa guarigione
Brucellosi	2 anni dalla completa guarigione
Osteomielite	2 anni dalla completa guarigione
Febbre Q	2 anni dalla completa guarigione
Tubercolosi	2 anni dalla completa guarigione
Febbre reumatica	2 anni dopo la cessazione dei sintomi in assenza di cardiopatia cronica
Toxoplasmosi, mononucleosi infettiva, m. di Lyme	6 mesi dopo la data di guarigione
Febbre > 38°C	2 settimane dopo la cessazione dei sintomi
Affezioni di tipo influenzale	2 settimane dopo la cessazione dei sintomi

Malaria:	
* Individui vissuti in zona malarica nei primi 5 anni di vita o per 5 anni consecutivi;	No alla donazione di sangue per 3 anni dall'ultimo soggiorno negli asintomatici; Si alla donazione di plasma per il frazionamento industriale
* Individui con pregressa malaria	Possono donare plasma da inviare al frazionamento industriale
* Visitatori asintomatici di zone endemiche	6 mesi dopo aver lasciato la zona di endemia
Virus del Nilo Occidentale (Wnv)	28 giorni dopo aver lasciato la zona con casi di malattia nell'uomo; 28 giorni dopo la risoluzione dei sintomi per i contagiati da Wnv
Viaggi in zone endemiche per malattie tropicali	3 mesi dal rientro (valutare lo stato di salute del donatore dopo il rientro)

ESPOSIZIONE A RISCHIO DI CONTRARRE UN'INFEZIONE TRASMISSIBILE CON IL SANGUE

Endoscopie; contatto mucosa-sangue; lesioni da ago; uso di trasfusioni o emoderivati; trapianto di cellule o tesausti; tatuaggio body piercing; agopuntura (tranne con ago usa e getta); persone a stretto contatto con affetti da epatite B; rapporti sessuali a rischio o con affetti a rischio di infezione da Hbv, Hcv, Hiv; intervento chirurgico maggiore	4 mesi dall'ultima esposizione
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

VACCINAZIONI

Virus o batteri vivi attenuati	4 settimane
Virus, batteri o rickettsie inattivati/uccisi	48 ore se il soggetto è asintomatico
Tossoidi	48 ore se il soggetto è asintomatico
Vaccini dell'Epatite A e B	48 ore se il soggetto è asintomatico e non esposti
Rabbia	48 ore se il soggetto è asintomatico e non esposti; un anno se somministrato dopo esposizione
Encefalite da zecche	Nessuna in soggetto asintomatico e non esposto

ALTRE ESCLUSIONI TEMPORANEE

Intervento chirurgico minore	1 settimana
Cure odontoiatriche	1 settimana per quelle di minore entità (comprese estrazioni, devitalizzazione, ecc...)
Terapie	Periodo variabile in base ai principi attivi usati, la farmacocinetica e la malattia oggetto di cura
Stati epidemiologici particolari (es. focolai malattia)	Secondo condizione epidemiologica
Allergie a farmaci	Specie penicillina: un anno dopo l'ultimo uso